

# Familles de vecteurs

Marc CHEVALIER  
DI ENS

sur une idée originale de Jérôme FERET

2018-2019

## 1 Familles libres

### Définition 1

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $I$  un ensemble. Une famille  $(u_i)_{i \in I}$  d'éléments de  $E$  est dite libre si et seulement si pour tout ensemble fini  $J \subseteq I$  et toute famille de scalaire  $(\lambda_j)_{j \in J}$ , on a :

$$\sum_{j \in J} \lambda_j \bullet u_j = 0_E \Leftrightarrow \forall j \in J, \lambda_j = 0.$$

### Définition 2

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et  $f$  une famille d'éléments de  $E$ . On dit que  $f$  est liée si et seulement si elle n'est pas libre.

### Remarque 1

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $I$  un ensemble fini. Une famille  $(u_i)_{i \in I} \in E^I$  d'éléments de  $E$  est libre si et seulement si pour tout toute famille de scalaires  $(\lambda_i)_{i \in I}$ , on a :

$$\sum_{i \in I} \lambda_i \bullet u_i = 0_E \Leftrightarrow \forall i \in I, \lambda_i = 0.$$

### Proposition 1

Si  $(E, +, \bullet)$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, alors les familles libres ne contiennent pas l'élément  $0_E$ .

### Exemple 1

Soit  $n \in \mathbb{N}$  un entier naturel. Soit  $(\mathbb{K}^n, +, \cdot)$  l'espace vectoriel des  $n$ -uplets de scalaires, muni de l'addition et la multiplication coordonnée par coordonnée. La famille  $(\delta^k)_{1 \leq k \leq n}$  de vecteurs telle que  $\delta_k$  a toutes ses coordonnées égales à 0, sauf la  $k$ -ième coordonnée qui vaut 1 est libre.

### Proposition 2

Soit  $(E, +, \cdot)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $I$  un ensemble. Si  $(u_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille libre d'éléments de  $E$  indexée par  $I$ . Soit  $J$  un sous ensemble de  $I$ . Alors, la famille  $(u_j)_{j \in J}$  est libre.

### Proposition 3

Soit  $(E, +, \cdot)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $I$  un ensemble. Si  $(u_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille d'éléments de  $E$  indexée par  $I$ . Soit  $\sigma$  une bijection de  $I$  dans  $I$ . Soit  $(v_i)_{i \in I} \in E^I$  la famille d'éléments de  $E$  définie par :

$$\left\{ v_i := u_{\sigma(i)}. \right.$$

Alors, la famille  $(u_i)_{i \in I}$  est libre si et seulement si la famille  $(v_i)_{i \in I}$  est libre.

### Proposition 4

Soit  $(E, +, \cdot)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $I$  un ensemble. Si  $(u_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille d'éléments de  $E$  indexée par  $I$ . Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $\lambda \neq 0$  et  $i_0 \in I$  un élément de  $I$ . Soit  $(v_i)_{i \in I} \in E^I$  la famille d'éléments de  $E$  définie par :

$$\left\{ \begin{array}{l} v_{i_0} := \lambda \cdot u_{i_0} \\ v_i := u_i \quad \text{pour } i \in I \setminus \{i_0\}. \end{array} \right.$$

Alors, la famille  $(u_i)_{i \in I}$  est libre si et seulement si la famille  $(v_i)_{i \in I}$  est libre.

### Proposition 5

Soit  $(E, +, \cdot)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $I$  un ensemble. Si  $(u_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille d'éléments de  $E$  indexée par  $I$ . Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Soient  $i_0 \in I$  et  $j_0 \in I$  deux éléments de  $I$  tels que  $i_0 \neq j_0$ . Soit  $(v_i)_{i \in I} \in E^I$  la famille

d'éléments de  $E$  définie par :

$$\begin{cases} v_{i_0} := u_{i_0} + \lambda \bullet u_{j_0} \\ v_i := u_i \end{cases} \quad \text{pour } i \in I \setminus \{i_0\}$$

Alors, la famille  $(u_i)_{i \in I}$  est libre si et seulement si la famille  $(v_i)_{i \in I}$  est libre.

### Proposition 6

Soient  $m$  et  $n$  deux entiers positifs dans  $\mathbb{N}$ . Soit  $(u_i)_{1 \leq i \leq m} \in (\mathbb{K}^n)^m$  une famille de  $m$  vecteurs du  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $(\mathbb{K}^n, +, \cdot)$ . Si pour tout  $i$  entre 1 et  $m$ , il existe une coordonnée  $j_i$  telle que pour tout indice  $i'$  entre 1 et  $m$ , la  $j_i$ -ième coordonnée de  $u_{i'}$  soit égale à 0 si et seulement si  $i' \neq i$ , alors la famille  $(u_i)_{1 \leq i \leq m}$  est libre.

---

### Algorithme 1 : Élimination de GAUSS-JORDAN

---

**Data :** Soient  $m$  et  $n$  deux entiers positifs dans  $\mathbb{N}$ . Soit  $(u_i)_{1 \leq i \leq m} \in (\mathbb{K}^n)^m$  une famille de  $m$  vecteurs de  $\mathbb{K}^n$ .

**Result :** L'algorithme suivant permet de décider si  $(u_i)_{1 \leq i \leq m}$  est libre, ou liée.

On note  $u_{i,j}$  la  $j$ -ième coordonnée du  $i$ -ième vecteur de la famille  $(u_i)_{1 \leq i \leq m}$ .

Prendre  $p \leftarrow 0$ .

1. si  $p = m$  alors la famille est libre.
  2. si  $p < m$  et s'il pour tout  $q$  entre 1 et  $n$ ,  $u_{p+1,q} = 0$ , alors la famille est liée.
  3. sinon, prendre  $q$  le plus petit entier tel que  $u_{p+1,q} \neq 0$ .
  4. Multiplier le vecteur  $u_{p+1}$  par l'inverse de  $u_{p+1,q}$ .
  5. Soustraire à chaque vecteur  $u_{p'}$  pour  $p' \neq p$  le vecteur  $u_{p+1}$  multiplié par  $u_{p',q}$ .
  6. Prendre  $p \leftarrow p + 1$ .
  7. Retourner à l'étape 1.
-

## 2 Familles génératrices

### Définition 3

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $I$  un ensemble. Une famille  $(u_i)_{i \in I}$  d'éléments de  $E$  est dite génératrice de  $(E, +, \bullet)$  si et seulement si pour tout élément  $u \in E$ , il existe un sous-ensemble fini  $J \subseteq I$  et une famille de scalaire  $(\lambda_j)_{j \in J}$ , tels que :

$$\sum_{j \in J} \lambda_j \bullet u_j = u.$$

### Proposition 7

Soit  $n \in \mathbb{N}$  un entier naturel. Soit  $I$  un ensemble et  $(u_i)_{i \in I}$  une famille d'éléments de  $\mathbb{K}^n$  telle qu'il existe un indice  $i_0 \in I$  tel que pour tout indice  $i \in I$ , la coordonnée  $i_0$  de  $u_i$  soit égale à 0. Alors la famille  $(u_i)_{i \in I}$  n'est pas génératrice.

### Proposition 8

Soit  $m, n \in \mathbb{N}$  deux entiers naturels. Soit  $(u_i)_{1 \leq i \leq m}$  une famille de  $m$  éléments de  $\mathbb{K}^n$ . On suppose qu'il existe un indice  $i_0$  tel que  $1 \leq i_0 \leq \min(m-1, n)$ , et tel que pour tout  $i$  entre 1 et  $i_0$ , la  $j$ -ième coordonnée du vecteur  $u_i$  vaut 1 si  $i = j$  et 0 sinon, et tel que pour tout  $i > i_0$  la  $i_0 + 1$ -ième coordonnée du vecteur  $u_i$  vaut 0. Alors la famille  $(u_i)_{1 \leq i \leq m}$  n'est pas génératrice.

### Exemple 2

Soit  $n \in \mathbb{N}$  un entier naturel. Soit  $(\mathbb{K}^n, +, \cdot)$  l'espace vectoriel des  $n$ -uplets de scalaires, muni de l'addition et la multiplication coordonnée par coordonnée. La famille  $(\delta^k)_{1 \leq k \leq n}$  de vecteurs telle que  $\delta_k$  a toutes ses coordonnées égales à 0, sauf la  $k$ -ième coordonnée qui vaut 1 est génératrice.

### Proposition 9

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $I$  un ensemble. Si  $(u_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille d'éléments de  $E$  indexée par  $I$ . Soit  $J$  un sous ensemble de  $I$ . Alors, si la famille  $(u_j)_{j \in J}$  est génératrice de  $E$ , alors la famille  $(u_i)_{i \in I}$  est génératrice de  $E$ .

**Proposition 10**

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $I$  un ensemble. Si  $(u_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille d'éléments de  $E$  indexée par  $I$ . Soit  $\sigma$  une bijection de  $I$  dans  $I$ . Soit  $(v_i)_{i \in I} \in E^I$  la famille d'éléments de  $E$  définie par :

$$\left\{ v_i := u_{\sigma(i)} \right.$$

Alors, la famille  $(u_i)_{i \in I}$  est génératrice si et seulement si la famille  $(v_i)_{i \in I}$  est génératrice.

**Proposition 11**

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $I$  un ensemble. Si  $(u_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille d'éléments de  $E$  indexée par  $I$ . Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $\lambda \neq 0$  et  $i_0 \in I$  un élément de  $I$ . Soit  $(v_i)_{i \in I} \in E^I$  la famille d'éléments de  $E$  définie par :

$$\left\{ \begin{array}{l} v_{i_0} := \lambda \bullet u_{i_0} \\ v_i := u_i \end{array} \right. \quad \text{pour } i \in I \setminus \{i_0\}$$

Alors, la famille  $(u_i)_{i \in I}$  est génératrice si et seulement si la famille  $(v_i)_{i \in I}$  est génératrice.

**Proposition 12**

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $I$  un ensemble. Si  $(u_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille d'éléments de  $E$  indexée par  $I$ . Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Soient  $i_0 \in I$  et  $j_0 \in I$  deux éléments de  $I$  tels que  $i_0 \neq j_0$ . Soit  $(v_i)_{i \in I} \in E^I$  la famille d'éléments de  $E$  définie par :

$$\left\{ \begin{array}{l} v_{i_0} = u_{i_0} + \lambda \bullet u_{j_0} \\ v_i = u_i \end{array} \right. \quad \text{pour } i \in I \setminus \{i_0\}$$

Alors, la famille  $(u_i)_{i \in I}$  est génératrice si et seulement si la famille  $(v_i)_{i \in I}$  est génératrice.

---

**Algorithme 2 : Comment trouver si une famille est génératrice ?**

---

Soient  $m$  et  $n$  deux entiers positifs dans  $\mathbb{N}$ . Soit  $(u_i)_{1 \leq i \leq m} \in (\mathbb{K}^n)^m$  une famille de  $m$  vecteurs de  $\mathbb{K}^n$ . On note  $u_{i,j}$  la  $j$ -ième coordonnée du  $i$ -ième vecteur de la famille  $(u_i)_{1 \leq i \leq m}$ . L'algorithme suivant permet de décider si  $(u_i)_{1 \leq i \leq m}$  est génératrice, ou non.

Prendre  $p \leftarrow 0$ .

1. si  $p = n$  alors la famille est génératrice.
  2. si  $p < n$  et si pour tout  $k$  tel que  $p < k \leq m$ , on a :  $u_{k,p+1} = 0$  alors la famille n'est pas génératrice.
  3. sinon, prendre  $k$  le plus petit entier strictement supérieur à  $p$  tel que  $u_{k,p+1} \neq 0$ .
  4. Multiplier le vecteur  $u_k$  par l'inverse de  $u_{k,p+1}$ .
  5. Soustraire à chaque vecteur  $u_{k'}$  pour  $k' \neq k$  le vecteur  $u_k$  multiplié par  $u_{k,p+1}$ .
  6. Permuter le vecteur  $u_{p+1}$  et  $u_k$ .
  7. Prendre  $p \leftarrow p + 1$ .
  8. Retourner à l'étape 1.
-

### 3 Bases et dimensions

#### Définition 4

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On appelle base de  $E$  toute famille d'éléments de  $E$  qui est à la fois libre et génératrice de  $E$ .

#### Théorème 1

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $I$  un ensemble et  $(u_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille d'éléments de  $E$  indexée par  $I$ , tel que  $(u_i)_{i \in I}$  soit une base de  $E$ . Alors pour tout vecteur  $u \in E$ , il existe un unique sous-ensemble  $J \subseteq I$  et une unique famille  $(\lambda_j)_{j \in J}$  de scalaires non nuls tel que :

$$u = \sum_{j \in J} \lambda_j \bullet u_j.$$

Ainsi tout vecteur admet une décomposition unique dans une base.

#### Exemple 3

Soit  $n \in \mathbb{N}$  un entier naturel. Soit  $(\delta_i)_{1 \leq i \leq n} \in (\mathbb{K}^n)^n$  la famille de  $n$  vecteurs de  $\mathbb{K}^n$  telle que la  $j$ -ième coordonnée du  $i$ -ième vecteur soit égale à 0 si  $i \neq j$  et à 1 sinon. Alors  $(\delta_i)_{1 \leq i \leq n} \in (\mathbb{K}^n)^n$  est une base de  $(\mathbb{K}^n, +, \cdot)$  (on dit que c'est la base canonique de  $\mathbb{K}^n$ ).

#### Proposition 13

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $I$  un ensemble. Si  $(u_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille d'éléments de  $E$  indexée par  $I$ . Soit  $\sigma$  une bijection de  $I$  dans  $I$ . Soit  $(v_i)_{i \in I} \in E^I$  la famille d'éléments de  $E$  définie par :

$$\begin{cases} v_i = u_{\sigma(i)} \end{cases}$$

Alors, la famille  $(u_i)_{i \in I}$  est une base de  $E$  si et seulement si la famille  $(v_i)_{i \in I}$  est une base de  $E$ .

#### Proposition 14

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $I$  un ensemble. Si  $(u_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille d'éléments de  $E$  indexée par  $I$ . Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$  tel que  $\lambda \neq 0$  et  $i_0 \in I$  un élément de  $I$ . Soit  $(v_i)_{i \in I} \in E^I$  la famille d'éléments de  $E$  définie

par :

$$\begin{cases} v_{i_0} = \lambda \bullet u_{i_0} \\ v_i = u_i \end{cases} \quad \text{pour } i \in I \setminus \{i_0\}$$

Alors, la famille  $(u_i)_{i \in I}$  est une base de  $E$  si et seulement si la famille  $(v_i)_{i \in I}$  est une base de  $E$ .

### Proposition 15

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $I$  un ensemble. Si  $(u_i)_{i \in I} \in E^I$  une famille d'éléments de  $E$  indexée par  $I$ . Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Soient  $i_0 \in I$  et  $j_0 \in I$  deux éléments de  $I$  tels que  $i_0 \neq j_0$ . Soit  $(v_i)_{i \in I} \in E^I$  la famille d'éléments de  $E$  définie par :

$$\begin{cases} v_{i_0} = u_{i_0} + \lambda \bullet u_{j_0} \\ v_i = u_i \end{cases} \quad \text{pour } i \in I \setminus \{i_0\}$$

Alors, la famille  $(u_i)_{i \in I}$  est une base si et seulement si la famille  $(v_i)_{i \in I}$  est une base.

### Théorème 2

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $J$  un ensemble fini. Soit  $I$  un sous-ensemble de  $J$ . Soit  $(u_j)_{j \in J}$  une famille d'éléments de  $E$ , tel que la famille  $(u_i)_{i \in I}$  soit une famille libre et la famille  $(u_j)_{j \in J}$  soit une famille génératrice de  $E$ . Alors il existe un ensemble  $K$  tel que  $I \subseteq K \subseteq J$  et la famille  $(u_k)_{k \in K}$  est une base de  $E$ .

### Théorème 3

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel qui admet une famille génératrice finie. Alors toutes les bases de  $(E, +, \bullet)$  ont le même cardinal.

### Définition 5

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel qui admet une famille génératrice finie. On dit que  $(E, +, \bullet)$  est de dimension finie et on appelle dimension de  $(E, +, \bullet)$  le cardinal des bases de  $E$ .



**Proposition 16**

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension fini égale à  $n$ . Alors toute famille libre de  $n$  élément est une base.

**Proposition 17**

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension fini égale à  $n$ . Alors toute famille génératrice de  $n$  élément est une base.

**Proposition 18**

Soit  $(E, +, \bullet)$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soit  $F$  un sous-espace vectoriels de  $(E, +, \bullet)$ . Si  $E$  et  $F$  sont de dimensions finies et égales. Alors  $E = F$ .

---

**Algorithme 3 : Comment trouver si une famille est libre ?**

---

Soient  $n$  un entier positif dans  $\mathbb{N}$ . Soit  $(u_i)_{1 \leq i \leq n} \in (\mathbb{K}^n)^n$  une famille de  $n$  vecteurs de  $\mathbb{K}^n$ . On note  $u_{i,j}$  la  $j$ -ième coordonnée du  $i$ -ième vecteur de la famille  $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$ . L'algorithme suivant permet de décider si  $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$  est libre, ou liée.

Prendre  $p \leftarrow 0$ .

1. si  $p = n$  alors la famille est une base.
  2. si  $p < n$  et si pour tout  $k$  tel que  $p < k \leq n$ , on ait  $u_{k,p+1} = 0$  alors la famille n'est pas une base.
  3. sinon, prendre  $k$  le plus petit entier strictement supérieur à  $p$  tel que  $u_{k,p+1} \neq 0$ .
  4. Multiplier le vecteur  $u_k$  par l'inverse de  $u_{k,p+1}$ .
  5. Soustraire à chaque vecteur  $u_{k'}$  pour  $k' \neq k$  le vecteur  $u_k$  multiplié par  $u_{k,p+1}$ .
  6. Permuter le vecteur  $u_{p+1}$  et  $u_k$ .
  7. Prendre  $p \leftarrow p + 1$ .
  8. Retourner à l'étape 1.
-