

Fonctions

Marc CHEVALIER
DI ENS

Septembre 2019

1 Généralités




FIGURE 1 – Des propriétés sur les fonctions

Les fonctions associent à chaque élément d'un ensemble un unique élément d'un autre ensemble. Les fonctions peuvent être vu comme un cas particulier des relations binaires.

Définition 1 – Relation fonctionnelle

Nous appelons une relation fonctionnelle de l'ensemble A vers l'ensemble B une partie de $A \times B$ telle que pour tout élément $a \in A$, pour tout élément $b, b' \in B$, $(a, b) \in \mathcal{R}$ et $(a, b') \in \mathcal{R}$ alors $b = b'$.

On peut l'écrire

$$\forall a \in A, \forall (b, b') \in B^2, (a, b) \in \mathcal{R} \wedge (a, b') \in \mathcal{R} \Rightarrow b = b'$$

Définition 2 – Relation applicative

Nous disons qu'une relation binaire \mathcal{R} entre un ensemble A et un ensemble B est une relation applicative, si et seulement si c'est une relation fonctionnelle et que pour tout élément $a \in A$ dans l'ensemble A , il existe un élément $b \in B$ dans l'ensemble B , tel que $(a, b) \in \mathcal{R}$.

On peut l'écrire

$$\forall a \in A, \exists ! b \in B, (a, b) \in \mathcal{R}$$

Nous pouvons maintenant définir les fonctions comme une relation fonctionnelle entre deux ensembles :

Définition 3 – Fonctions

Une fonction est une paire (A, B, \mathcal{R}) tel que A et B soient deux ensembles et \mathcal{R} est une relation fonctionnelle entre A et B .

Nous appelons l'ensemble A le domaine de définition de la fonction (A, B, \mathcal{R}) , l'ensemble B le codomaine de la fonction (A, B, \mathcal{R}) , et la relation binaire \mathcal{R} le graphe de la fonction (A, B, \mathcal{R}) .

Proposition 1

Soit A et B deux ensembles, la collection des fonctions entre l'ensemble A et l'ensemble B est un ensemble. Nous notons cet ensemble B^A .

Démonstration. L'ensemble des graphes des fonctions entre A et B est une partie du produit cartésien entre A et B . Puis, l'ensemble des fonctions de A vers B est le produit cartésien entre $\{A\}$, $\{B\}$, et l'ensemble des graphes de fonctions entre A et B . \square

Notation 1

Lorsque $f := (A, B, \mathcal{R})$ est une fonction, nous notons $b = f(a)$ pour dire que l'élément a de l'ensemble A et l'élément b de l'ensemble B sont en relation (pour \mathcal{R}).

Notation 2

Une fonction f entre l'ensemble A et l'ensemble B peut être noté de la manière suivante :

$$f : \begin{cases} A & \rightarrow & B \\ x & \mapsto & f(x) \end{cases}$$

Définition 4 – Identité

Soit A un ensemble. La fonction suivante :

$$\begin{cases} A & \rightarrow & A \\ a & \mapsto & a. \end{cases}$$

est bien définie. Nous notons cette fonction Id_A .

Proposition 2

Soit A un ensemble. Le graphe de la fonction Id_A est la relation $\Delta_A := \{(a, a) \mid a \in A\}$.

Exemple 1

Nous donnons d'autres exemples de fonctions.

- La fonction de l'ensemble $\{\perp, \top\}$ qui à \perp associe \top , et réciproquement se note de la manière suivante :

$$\begin{cases} \{\perp, \top\} & \rightarrow & \{\perp, \top\} \\ \perp & \mapsto & \top \\ \top & \mapsto & \perp \end{cases}$$

- La fonction de l'ensemble des entiers dans lui-même, qui à tout entier associe son successeur se note de la manière suivante :

$$\begin{cases} \mathbb{N} & \rightarrow & \mathbb{N} \\ n & \mapsto & n + 1. \end{cases}$$

Définition 5 – Égalité

Deux fonctions $f := (A, B, \mathcal{R})$ et $f' := (A', B', \mathcal{R}')$ sont égales si et seulement si les ensembles A et A' sont égaux, les ensembles B et B' sont égaux, et les ensemble \mathcal{R} et \mathcal{R}' sont égaux.

Proposition 3

Deux fonctions $f := (A, B, \mathcal{R})$ et $f' := (A', B', \mathcal{R}')$ sont égales si et seulement si les ensembles A et A' sont égaux, les ensembles B et B' sont égaux, et pour tout élément de A , nous avons $f(a) = f'(a)$.

Remarque 1

Deux fonctions différentes peuvent avoir le même graphe. Par exemple, les deux fonctions suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ n \mapsto n+1 \end{array} \right. \quad \text{et} \quad \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \\ n \mapsto n+1 \end{array} \right.$$

Définition 6 – Composition

Soient $A, B,$ et C trois ensembles et soient f une fonction entre l'ensemble A et l'ensemble B et g une fonction entre l'ensemble B et l'ensemble C .

Alors la fonction :

$$\left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow C \\ a \mapsto g(f(a)) \end{array} \right.$$

est bien définie. Nous notons cette fonction $g \circ f$.

2 In-, sur- et bijections

2.1 Injections

Soient A et B deux ensembles. Soit f une fonction entre l'ensemble A et l'ensemble B .

Définition 7 – Injection

Nous disons que f est une injection si et seulement si pour toute paire d'éléments $(a, a') \in A^2$, on a : $f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$.

Ainsi, pour prouver qu'on a une injection, on commence par prendre deux éléments de l'ensemble de départ (« Soit $(a, a') \in A^2$ »), supposer qu'ils ont la même image (« On suppose $f(a) = f(a')$ ») et on cherche à prouver qu'ils sont égaux (« On veut montrer que $a = a'$ »).

Corollaire 1 – Définition alternative

Soit f une fonction de A dans B . f est injective si et seulement si, pour toute paire d'éléments $(a, a') \in A^2$, $a \neq a' \Rightarrow f(a) \neq f(a')$.

Démonstration. La contraposée de la définition. □

Exemple 2

- La fonction identité sur A est injective.
- La fonction de l'ensemble des individus dans les entiers, qui a chaque individu associe son âge, n'est pas injective.
- La fonction de l'ensemble des individus immatriculés à la sécurité sociale, qui a chaque individu son numéro de sécurité sociale est injective.

Proposition 4

Soit $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$. Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective.

Démonstration. Soit $(x_1, x_2) \in A^2$. On suppose que $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$. Comme g est injective, on a $f(x_1) = f(x_2)$. Puis comme f est injective, $x_1 = x_2$. Donc $g \circ f$ est injective. \square

Proposition 5

Soit A, B et C des ensembles et $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$. Si $g \circ f$ est injective, alors f est injective.

Démonstration. Par contraposée. On suppose que f n'est pas injective. Par conséquent, il existe $(a, b) \in A^2$ tel que $f(a) = f(b)$.

Il vient $g(f(a)) = g(f(b))$. Donc $g \circ f$ n'est pas injective.

Par contraposition, on a la proposition. \square

Remarque 2

Il existe des fonctions $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ telles que $g \circ f$ est injective, mais où g n'est pas injective! Exemple :

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} \\ n \mapsto n \quad \quad \quad n \mapsto \max(0, n)$$

g n'est pas injective puisque $f(0) = 0 = f(-1)$. Mais $g \circ f$ est l'identité de \mathbb{N} . Donc est injective.

2.2 Surjections

Définition 8 – Surjection

Nous disons que f est une surjection si et seulement si pour tout élément $b \in B$ de l'ensemble B , il existe un élément $a \in A$ tel que $f(a) = b$.

Sous forme mathématique, cela donne :

$$\forall b \in B, \exists a \in A : f(a) = b$$

Ainsi, pour prouver qu'on a une surjection, il faut commencer par choisir un b (« Soit $b \in B$ ») et chercher $a \in A$ tel que $f(a) = b$. Cela revient très souvent à résoudre l'équation $f(a) = b$ d'inconnue a .

Exemple 3

- Si A est un ensemble, la fonction identité sur A est surjective.
- La fonction de l'ensemble des entiers relatifs dans lui-même, qui à chaque entier associe son successeur est surjective.
- La fonction de l'ensemble des entiers naturels dans lui-même, qui à chaque entier associe son successeur n'est pas surjective.

Proposition 6

Soit $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$. Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective.

Démonstration. Soit $z \in C$. On cherche une solution en x à $g \circ f(x) = z$. On sait que g est surjective. Il existe donc $y \in B$ tel que $g(y) = z$. De plus f est surjective, il existe donc $x \in A$ tel que $f(x) = y$. On a bien $g(f(x)) = z$. Donc f est surjective. \square

Proposition 7

Soit A, B et C des ensembles et $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$. Si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.

Démonstration. On suppose $g \circ f$ surjective. Soit $z \in G$. Il existe $x \in E$ tel que $g(f(x)) = z$. Par conséquent, on pose $y = f(x)$. On a $y \in F$ et $g(y) = z$. Il existe donc un antécédent de z par g . Donc g est surjective. \square

Remarque 3

Il existe des fonctions $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ telles que $g \circ f$ est surjective, mais où f n'est pas surjective! Exemple (le même que 2) :

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N} \\ n \mapsto n \quad \quad \quad n \mapsto \max(0, n)$$

f n'est pas surjective puisque -1 n'est jamais atteint. Mais $g \circ f$ est l'identité de \mathbb{N} . Donc est surjective.

2.3 Bijections

Définition 9 – Bijection

Une fonction qui est à la fois injective et surjective est une bijection.

Proposition 8

La fonction f est bijective si et seulement si, pour tout élément $b \in B$ de l'ensemble B , il existe un unique élément $a \in A$ de l'ensemble A tel que $b = f(a)$.

Démonstration. Cette proposition est une équivalence, on prouve par double implication.

(\Rightarrow) On suppose f bijective. On va prouver que pour tout $b \in B$, il existe un unique élément $a \in A$ tel que $b = f(a)$.

Soit $b \in B$. f est bijective, donc surjective. On sait donc qu'il existe au moins un élément $a \in A$ tel que $f(a) = b$. Prouvons qu'il est unique. Soit a et a' deux antécédents de b par f (ie. $f(a) = f(a') = b$). Comme f est bijective, elle est injective. Et par conséquent $a = a'$. Donc b n'a qu'un seul antécédent par f . Ce qui conclut le sens direct.

(\Leftarrow) On suppose que pour tout $b \in B$, $f(a) = b$ n'a qu'une seule solution en a . Prouvons que f est bijective.

Soit $b \in B$. Comme $f(a) = b$ a une solution, il suit que f est surjective.

Soit $(a, a') \in A^2$. On suppose $f(a) = f(a')$. On note $b = f(a)$. a et a' sont donc solutions de $f(x) = b$. Or, on sait par hypothèse qu'il n'y a qu'une unique solution. Donc $a = a'$, donc f est injective.

□

Il y a donc deux façon de montrer qu'une fonction est une bijection. On peut montrer que pour n'importe quel $b \in B$, l'équation $f(a) = b$ d'inconnue a n'a qu'une seule solution. On peut aussi appliquer simplement la définition et montrer indépendamment que f est une injection et une surjection.

Proposition 9

Notons $f := (A, B, \mathcal{R})$ et supposons que f est une bijection. Alors le triplet (B, A, \mathcal{S}) , où la relation \mathcal{S} entre B et A est définie par :

$$b\mathcal{S}a :\Leftrightarrow a\mathcal{R}b$$

est une fonction bijective entre l'ensemble B et l'ensemble A .

Nous appelons cette fonction l'inverse (ou bijection réciproque) de f , et la notons f^{-1} .

Proposition 10

Les deux propriétés suivantes sont vérifiées :

- $(f^{-1} \circ f) = Id_A$;
- $(f \circ f^{-1}) = Id_B$.

Corollaire 2

Soit $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$. Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est bijective.

Démonstration. Immédiat avec les propositions 4 et 6. □

Corollaire 3

Soit A, B et C des ensembles et $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$. On suppose $g \circ f$ bijective, alors f est injective et g surjective.

Démonstration. Immédiat avec les propositions 5 et 7. □

Remarque 4

Il existe des fonctions $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ telles que $g \circ f$ est bijective, mais où f n'est pas surjective et g pas injective! Exemple (encore le même que 2) :

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$n \mapsto n \quad \text{et} \quad n \mapsto \max(0, n)$$

On a déjà vu que f n'est pas surjective et g pas injective. Mais $g \circ f$ est l'identité de \mathbb{N} . Donc est bijective.

Proposition 11

Soit g une fonction de l'ensemble B dans l'ensemble A .
Si $g \circ f = Id_A$ et $f \circ g = Id_B$, alors f est bijective et son inverse est g .

Démonstration. Id_A et Id_B sont bijectives. D'après les propriétés 5 et 7, on sait que f et g sont bijectives.

Soit $x \in A$. On a $f(g(x)) = x$. En composant par f^{-1} , on a $g(x) = f^{-1}(x)$.
Donc $g = f^{-1}$. \square

Proposition 12

Soit f une bijection de A dans B et g une bijection de B dans A .
Si $g \circ f = Id_A$ ou $f \circ g = Id_B$, alors g est la bijection réciproque de f .

Démonstration. Soit $x \in A$. On a $f(g(x)) = x$. En composant par f^{-1} , on a $g(x) = f^{-1}(x)$. Donc $g = f^{-1}$. \square

Proposition 13

Soit $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$. On suppose que f et g sont bijectives. La bijection réciproque de $g \circ f$ est $f^{-1} \circ g^{-1}$.

Démonstration. $g \circ f$ est bijective d'après le corollaire 2. D'après la proposition 9, on sait que f^{-1} et g^{-1} sont des bijections. Donc (encore d'après 2) $f^{-1} \circ g^{-1}$ est une bijection

D'après la proposition 12 il suffit de vérifier que $(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = Id_C$.

$$\begin{aligned}(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) &= g \circ f \circ f^{-1} \circ g^{-1} \\ &= g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} \\ &= g \circ Id_B \circ g^{-1} \\ &= g \circ g^{-1} \\ &= Id_C\end{aligned}$$

\square

Remarque 5

Il existe des fonctions f et g tel que $g \circ f = Id_A$ mais où f et g ne sont pas bijectives. Toujours le même exemple fait l'affaire.